

СОГЛАСОВАНО

Заместитель Руководителя
Россельхознадзора



Н.А. ВЛАСОВ

29.02.2016

ИНСТРУКЦИЯ

по применению препарата Дронтал® плюс для лечения
и профилактики гельминтозов и лямблиоза собак

(Организация-разработчик: компания «Bayer Animal Health GmbH»,
Kaiser-Wilhelm-Allee 10, D-51373 Leverkusen, Германия)

I. Общие сведения

1. Торговое наименование лекарственного препарата: Дронтал® плюс (Dronтал plus).

Международное непатентованное наименование: пирантел, празиквантел, фебантел.

2. Лекарственная форма: таблетки для орального применения.

Дронтал® плюс в качестве действующих веществ в 1 таблетке на 10 кг содержит: пирантел эмбонат - 144 мг, празиквантел - 50 мг и фебантел - 150 мг, в 1 таблетке на 35 кг содержит: пирантел эмбонат - 504 мг, празиквантел - 175 мг и фебантел - 525 мг, а также вспомогательные вещества: лактозы моногидрат, микрокристаллическую целлюлозу, крахмал кукурузный, поливидон, магния стеарат, натрия лаурилы сульфат, кремний коллоидный безводный, пищевую добавку со вкусом мяса.

3. По внешнему виду Дронтал® плюс (1 таблетка на 10 кг) представляет собой таблетку в форме кости от светло-коричневого до темно-коричневого цвета с разделительной бороздкой по центру.

По внешнему виду Дронтал® плюс (1 таблетка на 35 кг) представляет собой таблетку овальной формы от светло-коричневого до темно-коричневого цвета с разделительной бороздкой по центру.

Срок годности препарата при соблюдении условий хранения - 5 лет со дня производства. Запрещается применение препарата Дронтал® плюс по истечении срока годности.

4. Таблетки Дронтал® плюс фасуют в блистеры по 2 и 6 таблеток, которые упаковывают в картонные пачки вместе с инструкцией по применению.

5. Хранят Дронтал® плюс в закрытой упаковке производителя в сухом, защищенном от прямых солнечных лучей месте, отдельно от продуктов питания и кормов, при температуре от 0°С до 25°С.

6. Дронтал® плюс следует хранить в местах, недоступных для детей.

7. Неиспользованный лекарственный препарат утилизируют в соответствии с требованиями законодательства.

8. Отпускается без рецепта ветеринарного врача.

II. Фармакологические свойства

9. Дронтал® плюс относится к группе комбинированных антигельминтных препаратов.

10. Дронтал® плюс обладает широким спектром антигельминтного действия в отношении круглых, ленточных гельминтов и простейших рода лямблий, паразитирующих у собак, включая *Toxocara canis*, *Toxascaris leonina*, *Uncinaria stenocephala*, *Ancylostoma caninum*, *Trihuris vulpis*, *Echinococcus multilocularis*, *Echinococcus granulosus*, *Taenia spp.*, *Dipylidium caninum*, *Multiceps multiceps*, *Mesocestoides spp.*, *Giardia spp.*

Механизм действия фебантела, входящего в состав лекарственного препарата основан на нарушении транспорта глюкозы и микротубулярной функции паразита, ингибировании фумаратредуктазы и синтеза АТФ, повышении проницаемости клеточных мембран, что приводит к нарушению мышечной иннервации, параличу, гибели паразита и способствует его элиминации из желудочно-кишечного тракта.

Пирантела эмбонат оказывает выраженное нематодоцидное действие, вызывая повышение проницаемости клеточных мембран, необратимый паралич и контрактуру мышц у нематод, что приводит к гибели паразита и способствует его элиминации из желудочно-кишечного тракта. Пирантела эмбонат и фебантел частично всасываются в кишечнике и выводятся из организма в основном с фекалиями в течение 24-48 часов.

Механизм действия празиквантела заключается в деполяризации нейромышечных ганглиоблокаторов, нарушении транспорта глюкозы и микротубулярной функции у цестод, что приводит к нарушению мышечной иннервации, параличу и гибели паразита. Празиквантел быстро всасывается в кишечнике и распределяется во внутренних органах и тканях; выводится из организма с мочой в основном в метаболизированной форме.

Дронтал® плюс по степени воздействия на организм относится к малоопасным веществам (4 класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76), в рекомендуемых дозах не оказывает эмбриотоксического, тератогенного и сенсибилизирующего действия. Хорошо переносится собаками разных пород и возрастов.

III. Порядок применения

11. Дронтал® плюс назначают собакам с профилактической и лечебной целью при нематодозах (токсокароз, токсаскаридоз, унцинариоз, анкилосто-

моз, трихоцефалез) и цестодозах (тениидозы, дипилидиоз, эхинококкозы, мезоцестозы) и гиардиозе (лямблиозе).

12. Противопоказанием к применению препарата Дронтал® плюс является индивидуальная повышенная чувствительность животного к компонентам препарата (в том числе в анамнезе).

13. Препарат применяют собакам индивидуально однократно из расчета 1 таблетка в форме кости на 10 кг массы животного или 1 таблетка овальной формы на 35 кг массы животного. Дозы препарата указаны в таблице:

Масса собаки	Дозировка препарата Дронтал® плюс 1 таблетка на 10 кг
Щенки и собаки маленьких пород	
2 - 5 кг	½ таблетки
6 - 10 кг	1 таблетка
Собаки средних пород	
11-20 кг	2 таблетки
21-30 кг	3 таблетки
Собаки крупных пород	
31-40 кг	4 таблетки
41-50 кг	5 таблеток

Для собак массой более 50 кг применяется дозировка из расчета 1 таблетка на 10 кг массы животного.

Масса собаки	Дозировка препарата Дронтал® плюс 1 таблетка на 35кг
10-17,5 кг	½ таблетка
17,5-35 кг	1 таблетка
35-52,5 кг	1½ таблетки
52,5-70 кг	2 таблетки

Для собак массой более 70 кг применяется дозировка из расчета 1 таблетка на 35 кг массы животного.

Благодаря вкусовой добавке, препарат хорошо поедается собаками. С лечебной целью животных дегельминтизируют по показаниям, с профилактической целью - ежеквартально в терапевтической дозе. Предварительной голодной диеты и применения слабительных средств перед дегельминтизацией не требуется.

При лечении лямблиоза препарат применяют в рекомендованных дозировках в течение 3-х дней подряд.

При дегельминтизации собак рекомендуется проводить дезинфекцию и дезинвазию мест содержания животных во избежание повторного заражения.

14. Симптомов, возникающих при передозировке препарата, не установлено.

15. Особенности действия лекарственного препарата при первом приеме или при его отмене не выявлено.

16. Дронтал® плюс не следует применять щенным сукам первые две трети периода беременности. Препарат разрешен к применению в период лактации. Не рекомендуется применять Дронтал® плюс щенкам моложе 2-х недельного возраста и массой менее 2 кг.

17. В случае несоблюдения установленного срока повторных обработок применение препарата следует возобновить в той же дозировке по той же схеме.

18. Побочных явлений и осложнений при применении препарата Дронтал® плюс в соответствии с настоящей инструкцией, как правило, не наблюдается. При повышенной индивидуальной чувствительности животного к компонентам препарата, возможны повышенная саливация, диарея или рвота. Указанные симптомы кратковременны, самопроизвольно исчезают и не требуют применения лекарственных средств.

19. Не рекомендуется применять Дронтал® плюс с препаратами, содержащими пиперазин, ввиду возможных антагонистических эффектов.

20. Дронтал® плюс не предназначен для применения продуктивным животным.

IV. Меры личной профилактики

21. При работе с препаратом следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными средствами. По окончании работы следует вымыть руки теплой водой с мылом.

22. Во время работы с препаратом не разрешается курить, пить и принимать пищу.

23. При случайном контакте с лекарственным препаратом с кожей или слизистыми оболочками глаз, их необходимо промыть большим количеством воды. Людям с гиперчувствительностью к компонентам препарата следует избегать прямого контакта с препаратом Дронтал® плюс. В случае появления аллергических реакций или при случайном попадании препарата в организм человека следует немедленно обратиться в медицинское учреждение (при себе иметь инструкцию по применению препарата или этикетку).

Наименования и адреса производственных площадок производителя лекарственного препарата для ветеринарного применения.

KVP Pharma + Veterinär Produkte GmbH; Projensdorfer Str. 324, D-24106 Kiel (Germany).

Наименование, адрес организации, уполномоченной держателем или владельцем регистрационного удостоверения лекарственного препарата на принятие претензий от потребителя.

АО "БАЙЕР"
Москва, 107113, 3-я Рыбинская ул., 18, стр. 2;
тел. (495) 234-2000

С согласования настоящей инструкции утрачивает силу инструкция по применению препарата Дронтал плюс утвержденная Россельхознадзором 14.08.2014 года.

Номер регистрационного удостоверения 276-3-2113-3032 N17ВМ-3-0.2/01178